

NUESTRA LUCHA
ES TU SALUD ANAL
¿CUÁL ES LA TUYA?

VISÍTANOS EN

 irma.alc

www.epicentro.org.pe

irma-alc@epicentro.org.pe


America latina y El Caribe


epicentro
HOMBRES • MUJERES • SALUD


Global Advocacy for HIV Prevention

TRATAMIENTO
COMO
PREVENCIÓN



¿QUÉ SIGNIFICA EL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL COMO PREVENCIÓN?

El “tratamiento como prevención” es un término que describe el uso de los fármacos antirretrovirales para la reducción del riesgo de que el VIH pase a otras personas. La estrategia funcionaría como un beneficio secundario del tratamiento antirretroviral después de su propósito principal de mejorar la salud del individuo.

La base para este enfoque está en el hecho de que los antirretrovirales (ARV) reducen la carga viral. Las cargas virales altas se han relacionado con un aumento del riesgo de que el VIH pase de una persona a su pareja sexual.

El tratamiento como prevención es un área emergente y se están empleando diferentes vocablos y frases para describir este enfoque, como por ejemplo “*haz la prueba y trata*” y “*realización de la prueba y enlace con los cuidados de salud*”, lo que reconoce que la prueba voluntaria y el diagnóstico del VIH son el primer paso del acceso a los cuidados de salud.

Hasta ahora, la decisión sobre si un individuo con VIH comienza ARV se basa en varios factores, incluidas las directrices de tratamiento que se utilicen allí donde viva. Estas directrices pueden incluir aspectos como el estado clínico del individuo, la coinfección con otras enfermedades e infecciones oportunistas, el recuento de células T, y las pruebas de carga viral (si están disponibles) para tomar una decisión sobre si comenzar o no a tomar ARV.

Habitualmente los ARV no se empiezan a tomar con el objetivo de reducir el riesgo de que el virus pase de la persona con VIH a otra. La sola excepción es el caso de las mujeres embarazadas o lactantes. Algunas estrategias para reducir el riesgo de infección en los bebés piden que la madre sea tratada con ARV, con independencia de las directrices clínicas, para reducir el riesgo de que el VIH pase al niño.



TRATAMIENTO
PREVENCIÓN